

ESPOSIZIONE A FARMACI, ALTRI PRODOTTI TOSSICI E VELENI

Le **intossicazioni da farmaci** al di sotto di un anno sono dovute principalmente a **errata somministrazione** da parte dei genitori.

I Cav (Centri Antiveleno) segnalano che le **intossicazioni per esposizione a prodotti per la pulizia della casa, per il lavaggio di bucato e stoviglie e a biocidi** rappresentano circa il 56% dei casi di esposizione a prodotti chimici non farmaceutici tra i minori di 6 anni.

Particolare attenzione va posta a **sigarette e tabacco**, in particolare sotto i due anni, l'ingestione infatti può causare una **grave intossicazione** con sintomi neurologici sino al coma.

Alcune **piante con principi attivi tossici** come quelli di Agrifoglio, Azalea, Ciclamino, Ortensia, Stella di Natale sono un rischio elevato tra 1-5 anni.

L'avvelenamento da monossido di carbonio (CO), gas inodore, si sviluppa per malfunzionamento di caldaie, avviene più spesso in modo "silenzioso" durante il sonno con sintomi dai più lievi come cefalea a stato confusionale a perdita di coscienza sino a morte .

CHE FARE NEL SOSPETTO DI INTOSSICAZIONE?



Chiama subito il Pediatra/ il Pronto Soccorso Pediatrico e il 112 (se ci sono sintomi)

E' SEMPRE IMPORTANTE TENERE A PORTATA DI MANO LA CONFEZIONE PER DARE INFORMAZIONI ESATTE

Non somministrare latte o altri alimenti

poiché potrebbero favorire l'assorbimento del prodotto tossico

Non provocare il vomito

ASL Nuoro
S.S.D. Prevenzione e Promozione della Salute
Mail: dipartimento.prevenzione@aslnuoro.it



PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2020-2025
PP5 -Sicurezza negli Ambienti di vita

INCIDENTI DOMESTICI IN ETA' PEDIATRICA

Prevenzione dell'esposizione ad agenti farmaceutici e non farmaceutici



Secondo l'OMS gli incidenti domestici rappresentano la prima causa di morte nei bambini nei paesi occidentali.

Nel 2021 ben il 23% delle cause di ricovero in Sardegna per incidenti domestici nei bambini di età 0-4 anni sono legate ad esposizioni ad agenti farmaceutici e non farmaceutici.

Da ricordare

Sono errori da evitare

Far giocare i bambini con contenitori vuoti di detersivi

Chiamare caramelle i farmaci e permettere loro di accedervi


Lasciare incustoditi alcolici, sigarette o tabacco che potrebbero essere ingeriti

Insegna a riconoscere i nuovi Simboli di Pericolo



Custodire **farmaci** in **posti lontani** dalla portata di un **bambino**, in un mobile **in alto** o con chiusura a chiave. Prestare attenzione alle indicazioni di somministrazione del medico.

Mantenere le **chiusure di sicurezza** previste e riporre sempre nella confezione **originale** qualsiasi prodotto, una volta utilizzato chiuderlo subito e riporlo in un luogo **sicuro**. Massima attenzione per detersivi, (mai nel sottolavello!) soprattutto quelli in capsule o “ecodosi”, che morbidi e colorati, con il loro aspetto potrebbero essere particolarmente invitanti e ricordare dolciumi.



Anche alcune delle **Piante Ornamentali** come **Azalea Agrifoglio**, o i semi di **Ricino** apparentemente innocui, contengono alcune tossine in particolare se ingerite, **insegnate quindi ai più piccoli a non metterle in bocca**.



Prevenzione è conoscere il rischio per modificare i comportamenti

Seguici anche sul sito
SardegnaSalute

