

Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025
Programma Predefinito PP5 – Sicurezza negli ambienti di vita

INCIDENTI DOMESTICI IN ETÀ PEDIATRICA: ESPOSIZIONE AD AGENTI FARMACEUTICI E NON FARMACEUTICI

In Sardegna nel 2021 il 23% delle cause di ricovero ospedaliero per incidenti domestici dei bambini di età 0-4 anni sono rappresentate dall'esposizione ad agenti farmaceutici e non farmaceutici.

Per consultare il Report sugli incidenti in ambito domestico e stradale in Sardegna e il materiale sulla prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica, scansiona il QR code e visita il sito tematico SardegnaSalute



Esposizione a farmaci

L'intossicazione acuta da farmaci può avvenire:

- al di sotto di 1 anno per errata somministrazione terapeutica dei medicinali da parte di un adulto
- da 1 a 5 anni per esposizione accidentale, il bambino è curioso e tende ad ingerire tutto quello che gli lasciamo a portata di mano
- in età adolescenziale per esposizione intenzionale, atti dimostrativi, tentativi di suicidio e uso di droghe



Esposizione accidentale ad altri prodotti tossici e veleni



I **detersivi** particolarmente pericolosi per i più piccoli sono quelli contenuti nelle confezioni monodose di detersivi per lavatrice o lavastoviglie (note come caps), essendo allettanti per forma e colore.

L'ingestione accidentale di **sigarette e di trinciato di tabacco** può portare a intossicazione e/o avvelenamento.

Esistono "le **piante nemiche dei bambini**", hanno un odore intenso, la linfa lattiginosa o le bacche rosse; alcune proprio insospettabili, devono diventare sorvegliate speciali specialmente se in casa si aggira un bambino nella fascia tra 1 e 2 anni (quella, cioè, in cui finisce tutto in bocca).

L'avvelenamento da **Monossido di carbonio** (CO) è più frequente in inverno per l'utilizzo di impianti di riscaldamento domestico a combustione.

Come EVITARE gli avvelenamenti accidentali:

- non somministrare farmaci senza prescrizione medica e attenersi scrupolosamente alle prescrizioni mediche
- conservare i farmaci nella loro confezione originale e non lasciarli incustoditi
- conservare i prodotti potenzialmente tossici, anche farmaci, fuori dalla portata dei bambini
- non travasare prodotti per l'igiene della casa in recipienti ad uso alimentare
- non mixare prodotti diversi per l'igiene domestica, ad esempio acidi con candeggina
- evitare di avere in casa piante potenzialmente tossiche, onde scongiurare l'ingestione di bacche o parti di piante da parte dei bambini
- verificare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento per contrastare il rischio di intossicazione da monossido di carbonio



Cosa NON fare in caso di ingestione di sostanza tossica

- non far vomitare il bambino
- non rimuovere forzatamente le compresse
- non far assumere latte o altre sostanze
- non improvvisare rimedi casalinghi
- non far mangiare il bambino dopo un'intossicazione



In caso di intossicazione contatta immediatamente Pediatra/
Pronto Soccorso Pediatrico/112